
FORUM SANTE ETUDIANTS

Enquête 2015 - 2016

Rapport de résultats

Candy Guiguet-Auclair - Ingénieur Statisticien - SSU Clermont-Ferrand

Emeline Born - Chargée de prévention - SSU Clermont-Ferrand

Anne Perreve - Médecin Coordonnateur - SSU Clermont-Ferrand

Sous la direction du **Pr. Laurent Gerbaud** - Directeur du SSU Clermont-Ferrand

TABLE DES MATIERES

1. Présentation du Forum Santé Etudiants.....	3
2. Méthodologie statistique	3
3. Données sociodémographiques.....	4
4. Consommation de tabac	6
3.1. Description de la consommation.....	6
3.2. Comparaison entre les hommes et les femmes	7
3.3. Comparaison entre les primo-inscrits et les autres.....	9
4. Consommation d'alcool.....	11
4.1. Description de la consommation.....	11
4.2. Comparaison entre les hommes et les femmes	12
4.3. Comparaison entre les primo-inscrits et les autres.....	14
5. Consommation de cannabis.....	16
5.1. Description de la consommation.....	16
5.2. Comparaison entre les hommes et les femmes	17
5.3. Comparaison entre les primo-inscrits et les autres.....	19
6. Consommation d'autres produits	20
6.1. Description de la consommation.....	20
6.2. Comparaison entre les hommes et les femmes	21
6.3. Comparaison entre les primo-inscrits et les autres.....	22

1. Présentation du Forum Santé Etudiants

Le Forum Sante Etudiant est une action du Service de Sante Universitaire (SSU) de Clermont-Ferrand qui permet d'aborder les thèmes des consommations de tabac, d'alcool, de cannabis et d'autres drogues des étudiants clermontois.

Ce forum se déroule sur une semaine au mois de novembre de chaque année universitaire afin d'intervenir tôt sur les modes de vie étudiants. Chaque jour l'action se déroule sur différents lieux de la vie étudiante (hall de la faculté de Médecine, CROUS, Maison de la vie étudiante aux Cézeaux, Pôle Tertiaire). Le forum est animé par des membres du personnel du SSU et des étudiants relais de prévention.

Cette action de prévention, en plus de son rôle de sensibilisation-information, permet un dépistage précoce des consommations à risques grâce aux autotests disponibles sur le forum. Il permet également de réaliser une enquête de consommation auprès des étudiants clermontois par auto-questionnaire, que les étudiants remplissent sur la base du volontariat. Les données sont anonymes.

2. Méthodologie statistique

Les données ont été saisies avec le logiciel Epi Data au SSU par Annie Rougeot puis analysées avec le logiciel SAS v9.4 au sein du service de Santé publique du CHU de Clermont-Ferrand par Candy Guiguet-Auclair.

Pour tous les tests effectués, le risque d'erreur consentie a été fixé à $\alpha=5\%$. Ainsi pour chaque test on rejettera l'hypothèse nulle (hypothèse d'absence de différence) pour chaque p-value inférieure à 0,05.

Les données quantitatives (continues) sont exprimées par la moyenne (écart-type) (m (ET)) ; les données qualitatives (catégorielles) sont exprimées en effectif (n) et pourcentage (%).

Les données quantitatives entre deux groupes ont été comparées à l'aide de tests paramétriques de comparaison de moyennes (test t de Student) lorsque les variables étaient gaussiennes. Dans le cas contraire, des tests non paramétriques ont été utilisés (test de Mann-Whitney). Si $p\text{-value}<0,05$, alors les moyennes sont significativement différentes. Sinon, aucune différence de moyenne n'a pu être mise en évidence entre les groupes.

Les données qualitatives ont été comparées entre groupes avec des tests du Chi-deux ou des tests exacts de Fisher (quand les conditions d'application du test du Chi-deux n'étaient pas respectées). Si $p\text{-value}<0,05$ alors les deux variables sont significativement liées. Sinon, aucun lien n'a pu être mis en évidence entre ces variables.

3. Données sociodémographiques

En 2015, 638 étudiants ont participé au Forum Santé Etudiants en remplissant le questionnaire.

Les étudiants enquêtés sont âgés en moyenne de 20,3 ans (écart-type de 2,2 ans), le plus jeune ayant 17 ans et le plus âgé 37 ans ; le sex-ratio H/F est de 0,7 et 94,3% sont de nationalité française.

Pour 23,3% des étudiants, il s'agit de leur première année d'inscription à l'université (6% de données manquantes ou non interprétables).

Les filières d'études les plus représentées par ordre décroissant sont les Sciences et Technologies, la Médecine et la Pharmacie (8,6% de données manquantes ou non interprétables).

Concernant le cycle d'études, 66,5% des étudiants sont en licence, 14% en master, 1,6% en doctorat et 17,9% dans un autre cycle (11,6% de données manquantes ou non interprétables).

	n	%	Taux de réponse
Sexe :			99,1%
Féminin	363	57,4	
Masculin	269	42,6	
Age (en années)			99,2%
<i>m (ET)</i>	633	20,3 (2,2)	
Etranger :			98,7%
Oui	36	5,7	
Non	594	94,3	
Continent :			98,7%
Afrique	13	2,1	
Amérique du Sud	4	0,6	
Asie	5	0,8	
Europe	608	96,5	

	n	%	Taux de réponse
Logement :			95,0%
Famille ou proches	155	25,6	
Résidence universitaire	101	16,7	
Colocation	84	13,9	
Location seul(e)	253	41,7	
Autre	13	2,1	

	n	%	Taux de réponse
Primo-inscription dans l'enseignement supérieur :			94,0%
Oui	140	23,3	
Non	460	76,7	
Délai depuis la 1ère inscription dans l'enseignement supérieur (en années)			94,0%
<i>m (ET)</i>	600	2,1 (1,9)	
Filière d'études :			91,4%
Agronomie	62	10,6	
Art	2	0,3	
Droit	61	10,5	
Economie	62	10,6	
Langues	4	0,7	
Management	8	1,4	
Médecine	110	18,9	
Pharmacie	75	12,9	
Santé	8	1,4	
Sciences Humaines	8	1,4	
Sciences et Technologies	179	30,7	
STAPS	4	0,7	
Cycle d'études :			88,4%
Licence	375	66,5	
Master	79	14,0	
Doctorat	9	1,6	
Autre	101	17,9	

4. Consommation de tabac

4.1. Description de la consommation

	n	%	Taux de réponse
Avoir déjà fumé du tabac au cours de sa vie :			99,2%
Oui	456	72,0	
Non	177	28,0	
Si oui, âge de la première fois (en années)			98,5%
<i>m (ET)</i>	449	15,6 (2,2)	
Nombre d'arrêt complet de tabac (aucune cigarette) pendant au moins 7 jours			47,1%
<i>m (ET)</i>	215	3,2 (11,4)	
Consommation actuelle de tabac :			97,6%
Fume tous les jours	139	31,2	
Fume occasionnellement (< 1 cigarette / jour)	79	17,8	
Été fumeur(se) mais a arrêté	28	6,3	
A essayé mais n'est jamais devenu(s) fumeur(se)	183	41,1	
N'a jamais fumé	16	3,6	
Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours :			94,5%
Aucune	197	45,7	
Moins d'1 par jour	78	18,1	
Entre 1 et 9 par jour	108	25,1	
Entre 10 et 20 par jour	41	9,5	
Plus de 20 par jour	7	1,6	
Le matin, après le réveil, temps au bout duquel la première cigarette est fumée :			86,6%
Dans les 5 minutes	11	2,8	
6 à 30 minutes	33	8,4	
31 à 60 minutes	40	10,1	
Plus de 60 minutes	47	11,9	
Ne fume pas le matin	264	66,8	
Consommation de chicha ou narguilé :			96,1%
Jamais	267	61,0	
Moins d'1 fois par semaine	167	38,1	
1 à 3 fois par semaine	2	0,5	
Plus de 3 fois par semaine	2	0,5	

Parmi les 72% d'étudiants déclarant avoir déjà fumé du tabac au cours de leur vie, 31,2% fument tous les jours actuellement, 17,8% fument occasionnellement, 6,3% ont arrêté et 41,1% ont essayé sans jamais devenir fumeur.

Parmi les étudiants déclarant avoir déjà fumé du tabac au cours de leur vie, 37,4% n'ont jamais arrêté complètement de fumer pendant au moins 7 jours, 56,1% ont arrêté entre 1 et 9 fois, et 6,5% plus de 10 fois.

Le tableau suivant résume les principaux résultats concernant les consommations de tabac obtenus les années précédentes.

Attention : Les différences de consommation de tabac entre années peuvent simplement être dues à certaines caractéristiques des étudiants, qui sont liées aux modes de consommation et qui sont différentes selon les échantillons enquêtés chaque année. Cette précaution s'applique pour les consommations des autres produits addictifs (cf. infra).

	FSE 2015 (n=638)	FSE 2014 (n=816)	FSE 2013 (n=796)	FSE 2012 (n=532)	FSE 2011 (n=432)	FSE 2010 (n=485)
Consommation de tabac :						
Expérimentation	72,0%	67,9%	69,9%	66,8%	69,9%	65,4%
Usage occasionnel	17,8%	16,9%	18,5%	19,2%	24,6%	23,4%
Usage quotidien	31,2%	26,4%	23,1%	19,5%	25,9%	35,3%
Usage quotidien important (≥ 10cig/jour)	11,1%	10,8%	8,1%	8,6%	5,6%	9,8%
Age moyen de la 1ère consommation	15,6 (2,2)	15,6 (2,3)	15,8 (2,5)	15,7 (2,5)	15,4 (2,4)	15,1 (2,2)

4.2. Comparaison entre les hommes et les femmes

72% des étudiants déclarent avoir déjà fumé du tabac au cours de leur vie, sans différence significative selon le sexe ($p=0,0991$). L'âge moyen de la première cigarette est de 15,6 ans (écart-type=2,2), sans différence entre hommes femmes ($p=0,1764$).

Le tabagisme actif concerne 49% des étudiants. Sont des fumeurs quotidiens 31,2% des étudiants (27,9% des hommes *versus* 34% des femmes, $p=0,1692$) et 17,8% des fumeurs occasionnels (20,3% des hommes *versus* 15,8% des femmes, $p=0,2165$).

La proportion des « gros fumeurs » (plus de 10 cigarettes par jour) est de 11,1%, sans différence entre les hommes et les femmes (10,5% des hommes *versus* 11,7% des femmes ; $p=0,7092$).

La majorité des étudiants (66,8%) ne fument pas leur première cigarette le matin après s'être réveillé. La proportion d'hommes fumant leur première cigarette dans les 30 minutes après le réveil n'est pas différente de celle des femmes (11,6% *versus* 10,7% respectivement).

39% des étudiants déclarent avoir consommé de la chicha ou narguilé, sans différence entre les hommes et les femmes (41,1% des hommes *versus* 37,1% des femmes, $p=0,3943$). Cette consommation reste occasionnelle avec une consommation moins d'une fois par semaine à 38,1%.

	Hommes (<i>n</i> =269)	Femmes (<i>n</i> =363)	<i>p</i>-value
Avoir déjà fumé du tabac au cours de sa vie : [<i>n</i> (%)]			0,0991
Oui	201 (75,8%)	253 (69,9%)	
Non	64 (24,2%)	109 (30,1%)	
Si oui, âge de la première fois (en années) <i>m</i> (ET)	15,8 (2,2)	15,5 (2,1)	0,1764
Nombre d'arrêt complet de tabac (aucune cigarette) pendant au moins 7 jours <i>m</i> (ET)	2,8 (6,6)	3,6 (14,2)	0,7624
Consommation actuelle de tabac : [<i>n</i>(%)]			0,4354
Fume tous les jours	55 (27,9%)	84 (34,0%)	
Fume occasionnellement (< 1 cigarette / jour)	40 (20,3%)	39 (15,8%)	
Été fumeur(se) mais a arrêté	15 (7,6%)	13 (5,3%)	
A essayé mais n'est jamais devenu(s) fumeur(se)	79 (40,1%)	103 (41,7%)	
N'a jamais fumé	8 (4,1%)	8 (3,2%)	
Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours : [<i>n</i>(%)]			0,4028
Aucune	90 (47,4%)	106 (44,2%)	
Moins d'1 par jour	37 (19,5%)	41 (17,1%)	
Entre 1 et 9 par jour	43 (22,6%)	65 (27,1%)	
Entre 10 et 20 par jour	19 (10,0%)	22 (9,2%)	
Plus de 20 par jour	1 (0,5%)	6 (2,5%)	
Le matin, après le réveil, temps au bout duquel la première cigarette est fumée : [<i>n</i>(%)]			0,2257
Dans les 5 minutes	5 (2,8%)	6 (2,8%)	
6 à 30 minutes	16 (8,8%)	17 (7,9%)	
31 à 60 minutes	12 (6,6%)	28 (13,1%)	
Plus de 60 minutes	19 (10,5%)	28 (13,1%)	
Ne fume pas le matin	129 (71,3%)	135 (63,1%)	
Consommation de chicha ou narguilé : [<i>n</i>(%)]			0,3390
Jamais	113 (58,9%)	154 (62,9%)	
Moins d'1 fois par semaine	78 (40,6%)	89 (36,3%)	
1 à 3 fois par semaine	0	2 (0,8%)	
Plus de 3 fois par semaine	1 (0,5%)	0	

4.3. Comparaison entre les primo-inscrits et les autres

L'expérimentation du tabac concerne 68,3% des étudiants primo-inscrits et 73,7% des autres étudiants, sans différence significative ($p=0,2175$). L'âge moyen de la première cigarette est de 15,1 ans (écart-type=1,4) pour les primo-inscrits et 15,7 ans (écart-type=2,3) pour les autres ($p=0,0291$).

33,3% des primo-inscrits sont des fumeurs quotidiens (31,1% des non primo-inscrits, $p=0,6823$) et 15,1% sont des fumeurs occasionnels (17,7% des non primo-inscrits, $p=0,5523$).

La proportion des « gros fumeurs » (plus de 10 cigarettes par jour) est légèrement moins importante chez les primo-inscrits (8,6%) que chez les autres étudiants (12%), la différence n'étant pas significative ($p=0,3631$).

Le matin après s'être réveillé, le temps au bout duquel l'étudiant fume sa première cigarette est similaire entre les primo-inscrits et les autres ($p=0,3172$).

La consommation de la chicha ou narguilé n'est pas différente entre les primo-inscrits et les autres étudiants ($p=0,9112$). La consommation occasionnelle (moins d'une fois par semaine) est de 40,9% chez les primo-inscrits et de 38,5% chez les autres.

	Primo- inscrits (n=140)	Non primo-inscrits (n=460)	p-value
Avoir déjà fumé du tabac au cours de sa vie : [n(%)]			0,2175
Oui	95 (68,3%)	336 (73,7%)	
Non	44 (31,7%)	120 (26,3%)	
Si oui, âge de la première fois (en années) <i>m (ET)</i>	15,1 (1,4)	15,7 (2,3)	0,0291
Nombre d'arrêt complet de tabac (aucune cigarette) pendant au moins 7 jours <i>m (ET)</i>	4,7 (21,4)	2,7 (5,9)	0,0893
Consommation actuelle de tabac : [n(%)]			0,8364
Fume tous les jours	31 (33,3%)	102 (31,1%)	
Fume occasionnellement (< 1 cigarette / jour)	14 (15,1%)	58 (17,7%)	
Été fumeur(se) mais a arrêté	8 (8,6%)	20 (6,1%)	
A essayé mais n'est jamais devenu(s) fumeur(se)	38 (40,9%)	137 (41,8%)	
N'a jamais fumé	2 (2,2%)	11 (3,4%)	
Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours : [n(%)]			0,4491
Aucune	44 (47,3%)	143 (45,1%)	
Moins d'1 par jour	13 (14,0%)	61 (19,2%)	
Entre 1 et 9 par jour	28 (30,1%)	75 (23,7%)	
Entre 10 et 20 par jour	6 (6,5%)	33 (10,4%)	
Plus de 20 par jour	2 (2,2%)	5 (1,6%)	
Le matin, après le réveil, temps au bout duquel la première cigarette est fumée : [n(%)]			0,3172
Dans les 5 minutes	3 (3,6%)	6 (2,0%)	
6 à 30 minutes	5 (6,0%)	27 (9,2%)	
31 à 60 minutes	13 (15,5%)	26 (8,9%)	
Plus de 60 minutes	11 (13,1%)	34 (11,6%)	
Ne fume pas le matin	52 (61,9%)	200 (68,3%)	
Consommation de chicha ou narguilé : [n(%)]			0,9112
Jamais	55 (59,1%)	195 (60,6%)	
Moins d'1 fois par semaine	38 (40,9%)	124 (38,5%)	
1 à 3 fois par semaine	0	2 (0,6%)	
Plus de 3 fois par semaine	0	1 (0,3%)	

5. Consommation d'alcool

5.1. Description de la consommation

	n	%	Taux de réponse
Avoir déjà bu de l'alcool au cours de sa vie :			100%
Oui	611	95,8	
Non	27	4,2	
Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours :			95,0%
0 fois	64	10,6	
1 à 2 fois	182	30,0	
3 à 5 fois (environ 1 fois par semaine)	167	27,6	
6 à 9 fois (1 à 2 fois par semaine)	124	20,5	
10 à 25 fois (3 à 5 fois par semaine)	60	9,9	
25 fois et plus (tous les jours ou presque)	9	1,5	
Avoir déjà été ivre en buvant de l'alcool au cours de sa vie :			95,8%
Oui	489	80,0	
Non	122	20,0	
Si oui, âge de la première ivresse (en années)			98,4%
<i>m (ET)</i>	481	16,1 (1,8)	
Avoir été ivre au cours des 12 derniers mois :			99,8%
Oui	437	89,5	
Non	51	10,5	
Si oui, nombre d'ivresses :			98,9%
Moins de 10 ivresses	245	56,7	
De 10 ivresses dans l'année à moins de 10 ivresses par mois	163	37,7	
10 ivresses et plus par mois	24	5,6	
Avoir constaté ne plus être capable de s'arrêter de boire une fois commencé au cours des 12 derniers mois :			97,5%
Jamais	467	78,4	
Moins d'1 fois par mois	69	11,6	
1 fois par mois	42	7,0	
1 fois par semaine	14	2,3	
Tous les jours ou presque	4	0,7	

Le tableau suivant résume les principaux résultats concernant les consommations d'alcool obtenus les années précédentes.

	FSE 2015 (n=638)	FSE 2014 (n=816)	FSE 2013 (n=796)	FSE 2012 (n=532)	FSE 2011 (n=432)	FSE 2010 (n=485)
Consommation d'alcool :						
Expérimentation	95,8%	90,0%	94,5%	93,8%	94,4%	94,0%
Usage au cours du mois	89,4%	81,5%	88,7%	85,4%	81,5%	82,7%
Usage régulier	11,4%	7,4%	12,0%	11,4%	19,4%	18,8%
Ivresse au cours de la vie	80,0%	80,7%	82,4%	79,4%	74,3%	77,1%
Ivresse au cours de l'année	89,5%	83,1%	84,3%	83,7%	61,6%	57,7%
Ivresse régulière	43,3%	31,1%	40,0%	38,0%	39,9%	35,5%
Age moyen de la 1ère ivresse	16,1 (1,8)	16,2 (1,7)	16,2 (1,9)	16,2 (2,0)	16,1 (2,1)	15,9 (2,0)

5.2. Comparaison entre les hommes et les femmes

95,8% des étudiants déclarent avoir déjà bu de l'alcool (bière, vin, cidre, alcools forts, apéritifs, cocktails, etc.) au cours de leur vie, sans différence significative ($p=0,3302$) entre les hommes et les femmes.

80% des étudiants déclarent avoir déjà été ivre en buvant de l'alcool au cours de leur vie, avec une prédominance masculine significative (85,9% des hommes *versus* 76,1% des femmes, $p=0,0026$). L'âge moyen de la première ivresse est de 16,1 ans (écart-type=1,8), sans différence significative entre les hommes et les femmes ($p=0,5391$). 89,5% des étudiants ont déjà été ivres au cours des 12 derniers mois, 91,8% des hommes et 87,6% des femmes ($p=0,1384$).

La consommation régulière d'alcool (au moins 10 usages au cours des 30 derniers jours) concerne 11,4% des étudiants, avec une nette prédominance des hommes : 18,2% *versus* 6,6% des femmes ($p<0,0001$). 43,3% des étudiants déclarent plus de 10 ivresses dans l'année, la différence étant significative entre les hommes et les femmes (54,5% des hommes *versus* 34,1% des femmes, $p<0,0001$).

Au cours des 12 derniers mois, 21,6% des étudiants mentionnent avoir constaté qu'ils n'étaient plus capables de s'arrêter de boire lorsqu'ils avaient commencé au moins 1 fois. Les hommes font significativement plus ce constat à 25,7% que les femmes à 18,6% ($p=0,0381$).

	Hommes (n=269)	Femmes (n=363)	p-value
Avoir déjà bu de l'alcool au cours de sa vie : [n(%)]			0,3302
Oui	256 (95,2%)	351 (96,7%)	
Non	13 (4,8%)	12 (3,3%)	
Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours : [n(%)]			0,0001
0 fois	17 (6,7%)	46 (13,2%)	
1 à 2 fois	66 (26,1%)	113 (32,4%)	
3 à 5 fois (environ 1 fois par semaine)	70 (27,7%)	97 (27,8%)	
6 à 9 fois (1 à 2 fois par semaine)	54 (21,3%)	70 (20,1%)	
10 à 25 fois (3 à 5 fois par semaine)	39 (15,4%)	21 (6,0%)	
25 fois et plus (tous les jours ou presque)	7 (2,8%)	2 (0,6%)	
Avoir déjà été ivre en buvant de l'alcool au cours de sa vie : [n(%)]			0,0026
Oui	220 (85,9%)	267 (76,1%)	
Non	36 (14,1%)	84 (23,9%)	
Si oui, âge de la première ivresse (en années) <i>m (ET)</i>			0,5391
	16,0 (1,9)	16,1 (1,7)	
Avoir été ivre au cours des 12 derniers mois : [n(%)]			0,1384
Oui	201 (91,8%)	234 (87,6%)	
Non	18 (8,2%)	33 (12,4%)	
Si oui, nombre d'ivresses : [n(%)]			<0,0001
Moins de 10 ivresses	90 (45,5%)	153 (65,9%)	
De 10 ivresses dans l'année à moins de 10 ivresses par mois	92 (46,5%)	71 (30,6%)	
10 ivresses et plus par mois	16 (8,1%)	8 (3,4%)	
Avoir constaté ne plus être capable de s'arrêter de boire une fois commencé au cours des 12 derniers mois : [n(%)]			0,0863
Jamais	185 (74,3%)	280 (81,4%)	
Moins d'1 fois par mois	30 (12,0%)	38 (11,0%)	
1 fois par mois	25 (10,0%)	17 (4,9%)	
1 fois par semaine	6 (2,4%)	8 (2,3%)	
Tous les jours ou presque	3 (1,2%)	1 (0,3%)	

5.3. Comparaison entre les primo-inscrits et les autres

Les primo-inscrits sont aussi nombreux que les autres étudiants à déclarer avoir déjà bu de l'alcool au cours de leur vie (96,4% *versus* 95,4% respectivement ; $p=0,6131$).

Les primo-inscrits déclarent à 68,9% avoir déjà été ivres au cours de leur vie, contre 83,6% des non primo-inscrits ($p=0,0002$). L'âge moyen de la première ivresse n'est pas significativement différent entre les primo-inscrits et les non primo-inscrits ($p=0,2720$).

La consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours est significativement plus importante chez les non- primo-inscrits ($p=0,0001$). Toutefois ils ne sont pas significativement plus nombreux à consommer régulièrement de l'alcool (au moins 10 usages au cours des 30 derniers jours) : 12,8% *versus* 9,8% des primo-inscrits, $p=0,3466$.

86% des étudiants primo-inscrits ont déjà été ivres au cours des 12 derniers mois, contre 91% des non primo-inscrits ($p=0,1547$). 32,9% des primo-inscrits ont eu des ivresses régulières au cours de l'année, contre 46,4% des non primo-inscrits, la différence étant significative ($p=0,0304$).

Au cours des 12 derniers mois, 16,7% des étudiants primo-inscrits mentionnent avoir constaté qu'ils n'étaient plus capables de s'arrêter de boire lorsqu'ils avaient commencé au moins 1 fois sans différence significative avec les non primo-inscrits qui sont 23,1% ($p=0,1174$).

	Primo- inscrits (n=140)	Non primo- inscrits (n=460)	<i>p-value</i>
Avoir déjà bu de l'alcool au cours de sa vie : [n(%)]			0,6131
Oui	135 (96,4%)	439 (95,4%)	
Non	5 (3,6%)	21 (4,6%)	
Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours : [n(%)]			0,0001
0 fois	25 (18,8%)	33 (7,6%)	
1 à 2 fois	49 (36,8%)	124 (28,4%)	
3 à 5 fois (environ 1 fois par semaine)	32 (24,1%)	125 (28,6%)	
6 à 9 fois (1 à 2 fois par semaine)	14 (10,5%)	99 (22,7%)	
10 à 25 fois (3 à 5 fois par semaine)	10 (7,5%)	50 (11,4%)	
25 fois et plus (tous les jours ou presque)	3 (2,3%)	6 (1,4%)	
Avoir déjà été ivre en buvant de l'alcool au cours de sa vie : [n(%)]			0,0002
Oui	93 (68,9%)	367 (83,6%)	
Non	42 (31,1%)	72 (16,4%)	
Si oui, âge de la première ivresse (en années) <i>m (ET)</i>			0,2720
	15,9 (1,4)	16,1 (1,8)	
Avoir été ivre au cours des 12 derniers mois : [n(%)]			0,1547
Oui	80 (86,0%)	333 (91,0%)	
Non	13 (14,0%)	33 (9,0%)	
Si oui, nombre d'ivresses : [n(%)]			0,0922
Moins de 10 ivresses	53 (67,1%)	177 (53,6%)	
De 10 ivresses dans l'année à moins de 10 ivresses par mois	22 (27,9%)	133 (40,3%)	
10 ivresses et plus par mois	4 (5,1%)	20 (6,1%)	
Avoir constaté ne plus être capable de s'arrêter de boire une fois commencé au cours des 12 derniers mois : [n(%)]			0,0388
Jamais	110 (83,3%)	330 (76,9%)	
Moins d'1 fois par mois	15 (11,4%)	47 (11,0%)	
1 fois par mois	3 (2,3%)	38 (8,9%)	
1 fois par semaine	2 (1,5%)	12 (2,8%)	
Tous les jours ou presque	2 (1,5%)	2 (0,5%)	

6. Consommation de cannabis

6.1. Description de la consommation

	n	%	Taux de réponse
Avoir déjà pris du cannabis au cours de sa vie :			99,7%
Oui	338	53,1	
Non	298	46,9	
Si oui, âge de la première fois (en années)			99,7%
<i>m (ET)</i>	337	16,6 (1,9)	
Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois :			98,8%
0 fois	90	26,9	
1 à 2 fois	106	31,7	
3 à 9 fois	60	18,0	
10 fois et plus	78	23,4	
Consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours :			99,7%
0 fois	211	62,6	
1 à 2 fois	67	19,9	
3 à 9 fois	28	8,3	
10 fois et plus	31	9,2	
Consommation de cannabis le matin :			99,1%
Jamais	285	85,1	
Rarement	40	11,9	
De temps en temps	8	2,4	
Assez souvent	1	0,3	
Très souvent	1	0,3	
Consommation de cannabis seul :			99,1%
Jamais	277	82,7	
Rarement	29	8,7	
De temps en temps	13	3,9	
Assez souvent	9	2,7	
Très souvent	7	2,1	
Ami(e)s fumant du cannabis :			98,8%
Aucun	14	4,2	
Quelques-uns	204	61,1	
Environ la moitié	60	18,0	
La plupart	46	13,8	
Tous	10	3,0	

Le tableau suivant résume les principaux résultats concernant les consommations de cannabis obtenus les années précédentes.

	FSE 2015 (n=638)	FSE 2014 (n=816)	FSE 2013 (n=796)	FSE 2012 (n=532)	FSE 2011 (n=432)	FSE 2010 (n=485)
Consommation de cannabis :						
Expérimentation	53,1%	44,8%	48,0%	42,0%	42,6%	41,9%
Usage au cours de l'année	73,1%	68,7%	72,2%	76,6%	31,1%	33,8%
Usage au cours du mois	37,4%	38,8%	38,4%	38,9%	16,1%	22,3%
Usage régulier	23,4%	22,4%	24,3%	23,0%	8,6%	10,8%
Age moyen de la 1ère consommation	16,6 (1,9)	16,9 (2,3)	16,7 (2,2)	16,7 (2,0)	16,4 (2,1)	16,2 (1,8)

6.2. Comparaison entre les hommes et les femmes

53,1% des étudiants déclarent avoir déjà pris du cannabis au cours de leur vie avec une différence significative selon le sexe : 60,7% des hommes et 48,2% des femmes ($p=0,0019$). L'âge lors de la première expérimentation est en moyenne de 16,6 ans (écart-type=1,9), sans différence significative selon le sexe ($p=0,3718$).

Les étudiants à 73,1% déclarent avoir consommé au moins une fois du cannabis au cours des 12 derniers mois. Les hommes ont en fait plus usage au cours de l'année que les femmes (76,3% *versus* 69,9% respectivement) sans que la différence soit significative ($p=0,1953$). 37,4% déclarent avoir consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, la consommation étant plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, sans que la différence soit significative (42,6% *versus* 32,8% respectivement, $p=0,0628$).

La consommation régulière de cannabis (plus de 10 fois au cours de l'année) concerne 23,4% des étudiants, avec une prédominance des hommes non significative (26,3% *versus* 20,8% des femmes, $p=0,2415$).

14,9% des étudiants ont au moins une fois consommé du cannabis le matin, avec une prédominance des hommes (18,8% *versus* 10,9% de femmes, $p=0,0433$). La consommation de cannabis seul concerne 17,3% d'étudiants, avec une proportion significativement plus élevée chez les hommes (21,9% d'hommes et 12,6% de femmes, $p=0,0251$). Enfin, 34,7% des étudiants déclarent que plus de moitié de leurs amis consomment du cannabis (35% chez les hommes et 34,7% chez les femmes, $p=0,9515$).

	Hommes (n=269)	Femmes (n=363)	p-value
Avoir déjà pris du cannabis au cours de sa vie : [n(%)]			0,0019
Oui	162 (60,7%)	175 (48,2%)	
Non	105 (39,3%)	188 (51,8%)	
Si oui, âge de la première fois (en années) m (ET)	16,8 (2,1)	16,5 (1,6)	0,3718
Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois : [n(%)]			0,4986
0 fois	38 (23,8%)	52 (30,1%)	
1 à 2 fois	50 (31,3%)	55 (31,8%)	
3 à 9 fois	30 (18,8%)	30 (17,3%)	
10 fois et plus	42 (26,3%)	36 (20,8%)	
Consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours : [n(%)]			0,2135
0 fois	93 (57,4%)	117 (67,2%)	
1 à 2 fois	34 (21,0%)	33 (19,0%)	
3 à 9 fois	16 (9,9%)	12 (6,9%)	
10 fois et plus	19 (11,7%)	12 (6,9%)	
Consommation de cannabis le matin : [n(%)]			0,1161
Jamais	130 (81,3%)	155 (89,1%)	
Rarement	25 (15,6%)	15 (8,6%)	
De temps en temps	4 (2,5%)	3 (1,7%)	
Assez souvent	1 (0,6%)	0	
Très souvent	0	1 (0,6%)	
Consommation de cannabis seul : [n(%)]			0,0827
Jamais	125 (78,1%)	152 (87,4%)	
Rarement	16 (10,0%)	12 (6,9%)	
De temps en temps	9 (5,6%)	4 (2,3%)	
Assez souvent	4 (2,5%)	5 (2,9%)	
Très souvent	6 (3,8%)	1 (0,6%)	
Ami(e)s fumant du cannabis : [n(%)]			0,9578
Aucun	7 (4,4%)	7 (4,0%)	
Quelques-uns	97 (60,6%)	106 (61,3%)	
Environ la moitié	28 (17,5%)	32 (18,5%)	
La plupart	24 (15,0%)	22 (12,7%)	
Tous	4 (2,5%)	6 (3,5%)	

6.3. Comparaison entre les primo-inscrits et les autres

	Primo- inscrits (n=140)	Non primo- inscrits (n=460)	<i>p-value</i>
Avoir déjà pris du cannabis au cours de sa vie : [n(%)]			0,1253
Oui	67 (47,9%)	253 (55,2%)	
Non	73 (52,1%)	205 (44,8%)	
Si oui, âge de la première fois (en années)			0,0011
<i>m (ET)</i>	16,0 (1,2)	16,8 (1,9)	
Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois : [n(%)]			0,4617
0 fois	13 (19,7%)	70 (27,9%)	
1 à 2 fois	23 (34,8%)	77 (30,7%)	
3 à 9 fois	15 (22,7%)	43 (17,1%)	
10 fois et plus	15 (22,7%)	61 (24,3%)	
Consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours : [n(%)]			0,3481
0 fois	48 (71,6%)	152 (60,3%)	
1 à 2 fois	9 (13,4%)	53 (21,0%)	
3 à 9 fois	4 (6,0%)	23 (9,1%)	
10 fois et plus	6 (9,0%)	24 (9,5%)	
Consommation de cannabis le matin : [n(%)]			0,2788
Jamais	57 (85,1%)	212 (84,8%)	
Rarement	9 (13,4%)	30 (12,0%)	
De temps en temps	0	7 (2,8%)	
Assez souvent	0	1 (0,4%)	
Très souvent	1 (1,5%)	0	
Consommation de cannabis seul : [n(%)]			0,5018
Jamais	57 (85,1%)	208 (83,2%)	
Rarement	6 (9,0%)	19 (7,6%)	
De temps en temps	1 (1,5%)	10 (4,0%)	
Assez souvent	3 (4,5%)	6 (2,4%)	
Très souvent	0	7 (2,8%)	
Ami(e)s fumant du cannabis : [n(%)]			0,6107
Aucun	2 (3,0%)	9 (3,6%)	
Quelques-uns	36 (53,7%)	158 (63,5%)	
Environ la moitié	14 (20,9%)	43 (17,3%)	
La plupart	12 (17,9%)	32 (12,9%)	
Tous	3 (4,5%)	7 (2,8%)	

47,9% des étudiants primo-inscrits déclarent avoir déjà pris du cannabis au cours de leur vie contre 55,2% des non primo-inscrits ($p=0,1253$). L'âge moyen de la première consommation est significativement différent entre les primo-inscrits et les non primo-inscrits : 16 ans (écart-type=1,2) *versus* 16,8 ans (écart-type 1,9) respectivement, $p=0,0011$.

La fréquence de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois n'est pas significativement différente entre les primo-inscrits et les autres étudiants ($p=0,4617$). 28,4% des étudiants primo-inscrits ont consommé de ce produit au moins une fois au cours des 30 derniers jours, sans différence significative avec les non primo-inscrits (39,7%, $p=0,0885$).

La consommation régulière de cannabis n'est pas plus fréquente chez les étudiants primo-inscrits (22,7% *versus* 24,3% chez les non primo-inscrits, $p=0,7896$).

14,9% des primo-inscrits ont au moins une fois consommé du cannabis le matin (contre 15,2% chez les autres, $p=0,9556$). La consommation seul concerne 14,9% des primo-inscrits, et 16,8% des non primo-inscrits ($p=0,7129$). 43,3% des primo-inscrits déclarent que plus de la moitié de leurs amis consomment du cannabis contre 32,9% des non primo-inscrits ($p=0,1151$).

7. Consommation d'autres produits

7.1. Description de la consommation

Les produits les plus expérimentés sont les produits à inhaler à 24,9%, puis les médicaments pour les nerfs, pour dormir à 22,9%.

44 étudiants, soit 7,7%, déclarent avoir pris au moins une fois au cours de leur vie d'autres drogues, parmi lesquelles ils citent : protoxyde d'azote ($n=16$), cannabis ($n=4$), salvia ($n=3$), N2O ($n=2$), shit ($n=2$), ayahuasca ($n=1$), kétamine ($n=1$), MDMA ($n=1$), weed ($n=1$).

Le tableau suivant résume les principaux résultats concernant les consommations de cannabis obtenus les années précédentes.

	FSE 2015 ($n=638$)	FSE 2014 ($n=816$)	FSE 2013 ($n=796$)	FSE 2012 ($n=532$)	FSE 2011 ($n=432$)	FSE 2010 ($n=485$)
Consommation au moins une fois au cours de sa vie :						
Médicaments pour les nerfs, pour dormir	22,9%	23,8%	22,5%	23,4%	24,0%	27,6%
Champignons hallucinogènes, LSD	5,7%	4,5%	6,2%	5,6%	5,1%	7,3%
Produits à inhaler (poppers, colle)	24,9%	20,9%	23,4%	21,6%	19,9%	24,9%
Ecstasy, Amphétamine, Speed	5,4%	5,5%	4,6%	4,5%	2,4%	4,9%
Cocaïne, Crack, Héroïne	3,1%	3,7%	4,7%	3,9%	3,4%	6,4%

	n	%	Taux de réponse
Consommation au cours de la vie de ...			
- Médicaments pour les nerfs, pour dormir :			96,4%
Non	474	77,1	
1 à 2 fois	72	11,7	
3 à 5 fois	34	5,5	
6 à 9 fois	7	1,1	
10 fois et plus	28	4,6	
- Champignons hallucinogènes, LSD :			96,2%
Non	579	94,3	
1 à 2 fois	25	4,1	
3 à 5 fois	5	0,8	
6 à 9 fois	0	0	
10 fois et plus	5	0,8	
- Produits à inhaler (poppers, colle) :			96,2%
Non	461	75,1	
1 à 2 fois	76	12,4	
3 à 5 fois	34	5,5	
6 à 9 fois	8	1,3	
10 fois et plus	35	5,7	
- Ecstasy, Amphétamine, Speed :			95,8%
Non	578	94,6	
1 à 2 fois	20	3,3	
3 à 5 fois	6	1	
6 à 9 fois	3	0,5	
10 fois et plus	4	0,7	
- Cocaïne, Crack, Héroïne :			95,8%
Non	592	96,9	
1 à 2 fois	11	1,8	
3 à 5 fois	4	0,7	
6 à 9 fois	2	0,3	
10 fois et plus	2	0,3	

7.2. Comparaison entre les hommes et les femmes

Les expérimentations (consommation au moins une fois au cours de sa vie) d'autres produits addictifs ne sont pas significativement différentes entre les hommes et les femmes, pour les produits à inhaler ($p=0,1514$), l'ecstasy ou amphétamine ou speed ($p=0,1223$) et la cocaïne ou crack ou héroïne ($p=0,1489$).

Les femmes déclarent plus expérimenter les médicaments pour les nerfs ou pour dormir (27,4% *versus* 16,9% des hommes, $p=0,0023$).

Les hommes ont quant à eux plus expérimenté les champignons hallucinogènes ou LSD (8,6% *versus* 3,7% des femmes, $p=0,0098$).

	Hommes (<i>n</i> =269)	Femmes (<i>n</i> =363)	<i>p-value</i>
Consommation au cours de la vie de ...	<i>n</i> (%)	<i>n</i> (%)	
- Médicaments pour les nerfs, pour dormir :			0,0023
Non	212 (83,1%)	257 (72,6%)	
Au moins une fois	43 (16,9%)	97 (27,4%)	
- Champignons hallucinogènes, LSD :			0,0098
Non	233 (91,4%)	340 (96,3%)	
Au moins une fois	22 (8,6%)	13 (3,7%)	
- Produits à inhaler (poppers, colle) :			0,1514
Non	184 (71,9%)	271 (77,0%)	
Au moins une fois	72 (28,1%)	81 (23,0%)	
- Ecstasy, Amphétamine, Speed :			0,1223
Non	234 (92,9%)	338 (95,8%)	
Au moins une fois	18 (7,1%)	15 (4,2%)	
- Cocaïne, Crack, Héroïne :			0,1489
Non	242 (95,7%)	344 (97,7%)	
Au moins une fois	11 (4,3%)	8 (2,3%)	

7.3. Comparaison entre les primo-inscrits et les autres

Les expérimentations d'autres produits addictifs ne sont pas significativement différentes entre les primo-inscrits et les autres étudiants.

	Primo- inscrits (n=140)	Non primo-inscrits (n=460)	<i>p-value</i>
Consommation au cours de la vie de ...	<i>n (%)</i>	<i>n (%)</i>	
- Médicaments pour les nerfs, pour dormir :			0,5375
Non	103 (75,7%)	349 (78,3%)	
Au moins une fois	33 (24,3%)	97 (21,7%)	
- Champignons hallucinogènes, LSD :			0,5627
Non	127 (95,5%)	421 (94,2%)	
Au moins une fois	6 (4,5%)	26 (5,8%)	
- Produits à inhaler (poppers, colle) :			0,2495
Non	106 (79,1%)	331 (74,2%)	
Au moins une fois	28 (20,9%)	115 (25,8%)	
- Ecstasy, Amphétamine, Speed :			0,1975
Non	129 (97,0%)	420 (94,2%)	
Au moins une fois	4 (3,0%)	26 (5,8%)	
- Cocaïne, Crack, Héroïne :			0,3839
Non	131 (98,5%)	430 (96,6%)	
Au moins une fois	2 (1,5%)	15 (3,4%)	